2019年5月22日

各　　位

会　社　名　　あすか製薬株式会社
代表者名　　代表取締役社長　山口　隆
（コード番号　　4514　東証第一部）
問い合わせ先　　経営企画部長　長尾智仁
（TEL.　03-5484-8366）

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤『カンデサルタン錠「あすか」』「高血圧症」に係る小児の「用法・用量」追加の承認取得のお知らせ

あすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口　隆、以下「あすか製薬」）は、持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤『カンデサルタン錠「あすか」※』（一般名：カンデサルタン　シレキセチル）において、2019年5月22日に「高血圧症」に係る小児の「用法・用量」追加の承認を取得しましたので、お知らせします。

なお、本件によるあすか製薬の2020年3月期業績への影響は軽微です。

改訂内容（＿＿＿部　改訂箇所）

カンデサルタン錠2mg・4mg・8mg・12mg「あすか」

効能・効果	用法・用量
高血圧症	成人 通常、成人には1日1回カンデサルタン　シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。 小児 通常、1歳以上6歳未満の小児には1日1回カンデサルタン　シレキセチルとして0.05～0.3mg/kgを経口投与する。通常、6歳以上の小児には1日1回カンデサルタン　シレキセチルとして2～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。 ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始し、必要に応じて8mgまで増量する。

（他の項目　省略）

「使用上の注意」等の改訂内容については、添付文書等をご参照ください。

※カンデサルタン錠「あすか」は日本初のカンデサルタン製剤のオーソライズド・ジェネリック（Authorized Generic；AG）です。

（オーソライズド・ジェネリックとは、先発医薬品メーカーから特許使用許諾を受けて製造されるジェネリック医薬品です。）

以　上